

Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.



ECOMECTIN[®] 0,6% PREMEZCLA PARA CERDOS

Presentación

Ecomectin[®] 0,6% Premezcla para cerdos es una premezcla granular de libre dispersión de color amarillo-marrón para la medicación de piensos para cerdos. Contiene 0,6% p/p de ivermectina.

Indicaciones

Cerdos

Tratamiento de las infecciones causadas por nematodos o artrópodos debidas a:

Lombrices gastrointestinales

Ascaris suum (adultos y L4)

Hyostrogylus rubidus (adultos y L4)

Oesophagostomum spp. (adultos y L4)

Strongyloides ransomi (adultos)*

Lombrices pulmonares

Metastrongylus spp. (adultos)

Piojos

Haematopinus suis

Ácaros de sarna

Sarcoptes scabiei var. *suis*

*La administración a cerdas gestantes antes de la fecha prevista de parto controla eficazmente la transmisión a través de la leche de *S. ransomi* a los lechones.

Posología y forma de administración

Para garantizar la dispersión a fondo del producto, primero debe mezclarse con una cantidad adecuada de pienso antes de incorporar en la mezcla final.

La dosis recomendada es 0,1 mg de ivermectina/kg de peso corporal al día durante 7 días consecutivos. La cantidad apropiada de inclusión de la premezcla de ivermectina, en gramos por tonelada de pienso final, puede calcularse de la siguiente manera:

Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.

$$\text{Cant. de inclusión de Premezcla} = \frac{100 \times \text{peso corporal medio (kg)}}{6 \times \text{ingesta media de alimento al día (kg)}} \text{ (g/tonelada de pienso)}$$

Para evitar la administración de una dosis insuficiente o de una sobredosis, se debe agrupar a los cerdos que vayan a recibir tratamiento conforme a su peso corporal y administrar la dosis calculada que corresponda al animal más pesado del grupo.

Cerdos de engorde:

La dosis recomendada de 0,1 mg/kg de peso corporal al día durante 7 días consecutivos se obtiene en la mayoría de los casos, para cerdos de hasta 40 kg de peso corporal, incluyendo 333 g de premezcla de ivermectina en cada tonelada métrica de pienso final. La premezcla de ivermectina debe mezclarse bien en el pienso final y administrarse de forma continua como único alimento durante 7 días consecutivos. En cerdos que pesen 40 kg de peso vivo o más, el consumo de pienso diario medio puede estar por debajo de una ingesta de pienso del 5% de peso corporal cuando se estén utilizando programas de alimentación restringida o cuando los cerdos se alimenten con una ración rica en proteínas.

Para cerdos que pesen 40 kg y más, incluir 400 g de premezcla de ivermectina en cada tonelada métrica de pienso final.

Cerdos adultos:

La dosis recomendada para cerdos adultos que pesen más de 100 kg de peso vivo se obtiene en la mayoría de los casos mezclando bien 1,67 kg de la premezcla de ivermectina en cada tonelada métrica de ración porcina. El pienso medicado resultante debe administrarse en la cantidad de 1 kg por 100 kg de peso corporal cada día durante 7 días consecutivos, como parte de la ración individual. Cuando el pienso medicado se administre como parte de la ración, se recomienda que el pienso medicado con ivermectina se administre primero. Una vez consumido, se administrará el resto de la asignación diaria de pienso. Esto debe repetirse durante 7 días consecutivos.

Alternativamente, cuando se pueda calcular con precisión la ingesta de pienso seco y todos los animales a tratar tengan pesos corporales similares, se puede calcular la cantidad de inclusión utilizando la fórmula previa para que los animales se alimenten únicamente con el pienso medicado.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO RECOMENDADO

Cerdos de engorde:

Los grupos de cerdos de engorde recibirán tratamiento durante 7 días consecutivos al cambiarles a alojamientos limpios. Cuando el sistema "Todo dentro/Todo fuera" no sea posible, se recomienda que el programa de control de parásitos en el pienso comience con el tratamiento de todos los cerdos de engorde que ya se encuentre en el recinto.

Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.

Animales reproductores:

Los animales reproductores reciben el tratamiento mediante la administración de pienso medicado durante 7 días consecutivos. En el momento de comenzar cualquier programa de control de parásitos, es importante tratar a todos los animales de la piara. Después del tratamiento inicial, se debe utilizar la premezcla periódicamente de la siguiente manera:

Cerdas:

Tratamiento durante 14-21 días antes de la fecha prevista de parto para minimizar las infecciones en los lechones.

Cerdas jóvenes:

Tratamiento durante 14-21 días antes de la fase de reproducción. Tratamiento durante 14-21 días antes de la fecha prevista de parto.

Verracos:

Tratamiento al menos 2 veces al año. La frecuencia y la necesidad de los tratamientos dependen de la exposición a parásitos.

Únicamente los fabricantes de piensos autorizados incorporarán este producto.

El producto puede incorporarse al pienso granulado precondicionado con vapor durante un máximo de 10 segundos a una temperatura que no exceda los 65°C.

Contraindicaciones, advertencias, etc.

Tiempo de espera

Cerdos: 12 días

Este producto puede administrarse a cerdas en cualquier momento de la gestación o lactación.

Este producto puede utilizarse en animales de reproducción.

Advertencias para el usuario

- La mezcla del producto con el pienso debe hacerse en un lugar bien ventilado.
- Utilice una máscara antipolvo y lleve guantes protectores y gafas de seguridad reglamentarias.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental, lávese a fondo la zona afectada con agua corriente limpia. Si la irritación persiste, acuda al médico.
- Lávese la piel expuesta después del uso.
- No fume, coma o beba durante el uso.

Precauciones farmacéuticas

Es esencial mezclar las cantidades exactas. Para garantizar una dispersión uniforme en el pienso se recomienda que la cantidad requerida de Ecomectin® 0,6% Premezcla se mezcle primero con 10 veces su peso de pienso antes de mezclarlo en el pienso final.

Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.

No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en un lugar seco.

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 18 meses.

Período de validez después de su incorporación al pienso: 8 semanas en harina y 4 semanas en gránulos.

Precauciones generales

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. Únicamente para uso veterinario.

Sumamente peligroso para los peces y la vida acuática. No contaminar las aguas superficiales o arroyos con el producto o el envase utilizado.

Eliminación del envase

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas nacionales.

Tamaño del envase

Bolsa de aluminio de 333 g

Bolsa de aluminio de 5,0 kg dentro de una bolsa laminada de polipropileno/papel.

Es posible que no se comercialicen todas las presentaciones.

Información adicional

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos.

Cuando se incluyó en la ración de los cerdos en cantidades hasta 5 veces la dosis recomendada de 0,1 mg de ivermectina por kg de peso corporal durante 21 días consecutivos (3 veces el periodo de tratamiento recomendado), el medicamento no produjo reacciones adversas relacionadas con el tratamiento. No se ha identificado ningún antídoto.

Este producto se ha formulado en el Reino Unido.

ECO Animal Health
PO Box 47542
London N14 6WS
Reino Unido

Tel: +44 (0)208 447 8899
Fax: +44 (0)208 447 9292
Sitio web: www.ecoanimalhealth.com