

Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.



ECOMECTIN® 1,87% PASTA PARA CABALLOS

Presentación

Ecomectin® 1,87% Pasta para caballos es una pasta oral para caballos. Contiene 18,7mg/g de ivermectina.

Indicaciones

Caballos

Para el tratamiento de los siguientes parásitos:

- Estróngilos grandes (adultos y estadios larvarios arteriales de *Strongylus vulgaris*; adultos de *S. edentatus* y adultos de *S. equinus*).
- Estróngilos pequeños adultos e inmaduros (ciatostomas) incluyendo cepas resistentes a benzimidazol:
- *Parascaris equorum* (adultos e inmaduros).
- *Oxyuris equi* (adultos e inmaduros).
- *Gasterophilus spp.* (estadios de las moscas orales y gástricos).
- Microfilarias de *Onchocerca cervicalis*.

Posología y forma de administración

Posología:

Una parte de la jeringa de pasta por 100 kg de peso corporal (en base al nivel de dosis recomendado de 200 µg de ivermectina por kg de peso corporal). El contenido total de una jeringa (seis partes) será la dosis para un caballo de 600 kg.

Administración:

La pasta se administra por vía oral. Se debe introducir la jeringa en el espacio interdental, depositando la pasta en la base de la lengua.

El producto puede administrarse a yeguas en cualquier momento de la gestación o lactación. El producto puede utilizarse en yeguas reproductoras y en sementales y no afecta a la fertilidad. El producto puede administrarse a animales de todas las edades, incluidos potros jóvenes.

Contraindicaciones, advertencias, etc.

Periodo de retiro

Tejidos comestibles: 21 días después del último tratamiento.

Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.

Advertencias para el usuario

- No fume, coma o beba cuando esté manipulando el producto.
- Lávese las manos después del uso.

Precauciones farmacéuticas

No conservar a temperatura superior a 25°C.

Proteger de la luz directa.

Periodo de validez: 36 meses.

Precauciones generales

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. Únicamente para uso veterinario.

Sumamente peligroso para los peces y la vida acuática. No contaminar las aguas superficiales o arroyos con el producto o el envase utilizado.

Eliminación del envase

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas nacionales.

Tamaño del envase

Jeringa multidosis de polietileno de alta densidad.

Tamaño del envase: 1 jeringa contiene 6,42 g de pasta.

Información adicional

No se conocen interacciones entre este producto y otros medicamentos veterinarios.

El uso frecuente y repetido de ivermectina puede dar lugar al desarrollo de resistencia. Al igual que con todos los antihelmínticos, un veterinario deberá establecer los programas de dosificación apropiados y el manejo de los animales para lograr un control parasitario adecuado y reducir la posibilidad de desarrollar resistencia a los antihelmínticos.

En caso de que aparezcan signos de toxicidad, se suspenderá el tratamiento inmediatamente.

Algunos caballos portadores de una fuerte infección por microfilarias de *Onchocerca* han experimentado edema y prurito tras la administración, que se presume que se debe a la muerte de un gran número de microfilarias. Estos signos remiten en unos días pero es aconsejable administrar un tratamiento sintomático.

No usar en caballos hipersensibles al principio activo.

Este producto se ha formulado específicamente para usar únicamente en caballos.

No usar en perros ni gatos ya que podrían producirse reacciones adversas severas.

Los perros y los gatos pueden verse adversamente afectados por la concentración de ivermectina en este producto si se deja que ingieran pasta derramada o que tengan acceso a las jeringas utilizadas.

Se han observado signos transitorios leves (respuesta pupilar lenta a la luz y depresión) con una dosis mayor de 1,8 mg/kg (9 veces la dosis recomendada). Otros

Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.

signos observados con dosis mayores incluyen midriasis, ataxia, temblores, estupor, coma y muerte. Los signos menos severos han sido transitorios. En el caso de sobredosis accidental, se suspenderá la medicación inmediatamente. Por lo demás el tratamiento es sintomático.

Este producto se ha formulado en el Reino Unido.

ECO Animal Health
PO Box 47542
London N14 6WS
Reino Unido

Tel: +44 (0)208 447 8899
Fax: +44 (0)208 447 9292
Sitio web: www.ecoanimalhealth.com