

Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.



### AIVLOSIN® 8,5 mg/g Polvo oral

#### **Presentación**

Aivlosin® 8,5 mg/g Polvo oral contiene tilvalosina 8,5 mg/g (como tilvalosina tartrato) en un vehículo de harina de trigo de y trisilicato de magnesio.

#### **Propiedades**

La tilvalosina es un antibiótico macrólido nuevo basado en un anillo de lactona muy activo. Posee actividad antibacteriana frente a organismos gram positivos y algunos gram negativos y frente a micoplasma. Actúa inhibiendo la síntesis proteica en la célula bacteriana. Es muy eficaz frente a diferentes enfermedades importantes en cerdos y aves de corral.

La tilvalosina posee una acción tanto bacteriostática como bactericida además de poseer el beneficio adicional de la actividad antimicrobiana del metabolito principal 3-AT.

La tilvalosina puede actuar intracelularmente y alcanza concentraciones intracelulares relativamente altas en células fagocitarias (macrófagos y neutrófilos). Puede aumentar específicamente la actividad de los macrófagos, ayudando al sistema inmunológico innato (no específico) a eliminar las partículas extrañas, tales como los patógenos.

#### **Indicaciones**

##### **Ganado porcino**

Aivlosin® 8,5 mg/g Polvo oral está indicado para el tratamiento y la prevención de la Neumonía Enzoótica porcina causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*, la Ileítis (Enteropatía Proliferativa Porcina) causada por la bacteria intracelular *Lawsonia intracellularis* y la disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*. Aivlosin® es asimismo activo frente a *Brachyspira pilosicoli*, causante de la Colitis Porcina.

#### **Posología y forma de administración**

Para el tratamiento de los cerdos de forma individual o en granjas donde sólo vayan a recibir el tratamiento un pequeño número de cerdos. Los grupos más grandes deberán recibir tratamiento con pienso medicado que contenga la premezcla.

##### **Para el tratamiento y la prevención de la Neumonía Enzoótica**

La pauta posológica es 2,125 mg de tilvalosina por kg de peso corporal al día durante 7 días consecutivos.

**Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.**

La infección secundaria causada por organismos como *Pasteurella multocida* y *Actinobacillus pleuropneumoniae* puede complicar la Neumonía Enzoótica y requerir una medicación específica.

Para el tratamiento de la Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis)

La pauta posológica es 4,25 mg de tilvalosina por kg de peso corporal al día durante 10 días consecutivos.

Para el tratamiento y la prevención de la Disentería Porcina

La pauta posológica es 4,25 mg de tilvalosina por kg de peso corporal al día durante 10 días consecutivos.

Esto se obtiene mezclando bien Aivlosin® 8,5 mg/g Polvo oral en la ración diaria para cada cerdo de forma individual. Se facilitan cazos de 3 tamaños para medir la cantidad correcta de Aivlosin® 8,5 mg/g Polvo oral para mezclar con la ración diaria, conforme al programa que se muestra más abajo. El pienso que contiene el Polvo oral deberá administrarse como única ración durante los periodos arriba recomendados.

Se debe pesar al cerdo que va a recibir tratamiento y se calcula la cantidad de pienso que probablemente consumirá, en función de una ingesta de alimento diaria equivalente al 5% de su peso corporal. Se deben tener en cuenta los cerdos con una ingesta diaria de alimentos reducida o restringida. Debe añadirse la cantidad correcta de Aivlosin® 8,5 mg/g Polvo oral a la ración diaria calculada para cada cerdo, en un cubo o recipiente similar, y mezclar bien.

El producto únicamente debe mezclarse con pienso seco no granulado.

<b>Neumonía Enzoótica Porcina 2,125 mg/kg de peso corporal</b>		
Peso corporal (kg)	Tamaño del cazo	Número de cazos
6,5 - 12	5 ml	1
13 - 24	10 ml	1
25 - 48	10 ml	2
49 - 72	10 ml	3
73 - 96	10 ml	4
97 - 120	10 ml	5
121 - 144	10 ml	6
145 - 168	10 ml	7
169 - 192	10 ml	8
Nota: Debe medirse un cazo raso del producto		

<b>EPP (ileítis) y Disentería Porcina 4,25 mg/kg de peso corporal</b>		
Peso corporal (kg)	Tamaño del cazo	Número de cazos
6,5-12	10 ml	1
13-24	10 ml	2
25-48	10 ml	4
49-72	10 ml	6
73-96	10 ml	8
97-115	25 ml	4
116-145	25 ml	5
146-175	25 ml	6
176-200	25 ml	7
Nota: Debe medirse un cazo raso del producto		

**Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.**

Como adyuvante a la medicación, y a fin de reducir el riesgo de infección y controlar el potencial de crear resistencia, se deben seguir unas buenas prácticas de higiene y manejo.

### **Contraindicaciones/advertencias, etc.**

#### ***Contraindicaciones***

Ninguna.

#### ***Periodo de retiro***

Carne y vísceras: Dos días

#### ***Advertencias para el usuario***

Al mezclar el medicamento veterinario y manipular el pienso medicado, se debe evitar el contacto directo con los ojos, la piel y las mucosas. Lávese bien las manos y la piel expuesta después del uso. En caso de contacto ocular, aclárese inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta. Las personas hipersensibles a tilvalosina tartrato deben evitar el contacto con el producto.

#### ***Precauciones farmacéuticas***

No conservar el producto a temperatura superior a 25°C. Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol.

Asegúrese de cerrar bien la bolsa después de cada uso. Conservar en el envase original.

#### ***Precauciones generales***

Únicamente para uso veterinario. Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

#### ***Tamaño del envase***

Aivlosin® 8,5 mg/g Polvo oral está envasado en bolsas de papel recubiertas de polietileno de 1 kg y 3 kg que contienen 1 kg ó 3 kg.

#### ***Eliminación del envase***

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo y los envases vacíos deberán eliminarse de forma segura y de conformidad con las normativas locales sobre eliminación de residuos.

### **Información adicional**

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años  
El pienso medicado que no se consuma en 24 horas deberá cambiarse.

Si desea más información, contacte con:

ECO Animal Health  
PO Box 47542  
London N14 6WS  
Reino Unido

**Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.**

Tel: +44 (0)208 447 8899

Fax: +44 (0)208 447 9292

Sitio web: [www.ecoanimalhealth.com](http://www.ecoanimalhealth.com) y [www.aivlosin.com](http://www.aivlosin.com) o [www.valosin.com](http://www.valosin.com)