

Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.



## AIVLOSIN® SOLUBLE

### Presentación

Aivlosin® Soluble oral contiene tilvalosina (como tilvalosina tartrato) en forma de gránulos de flujo libre dispersión fácilmente solubles.

### Propiedades

La tilvalosina es un antibiótico macrólido nuevo basado en un anillo de lactona muy activo. Posee actividad antibacteriana frente a organismos gram positivos y algunos gram negativos y frente a micoplasma. Actúa inhibiendo la síntesis proteica en la célula bacteriana. Es muy eficaz frente a diferentes enfermedades importantes en cerdos y aves de corral.

La tilvalosina posee una acción tanto bacteriostática como bactericida además de poseer el beneficio adicional de la actividad antimicrobiana del metabolito principal 3-AT.

La tilvalosina puede actuar intracelularmente y alcanza concentraciones intracelulares relativamente altas en células fagocitarias (macrófagos y neutrófilos). Puede aumentar específicamente la actividad de los macrófagos, ayudando al sistema inmunológico innato (no específico) a eliminar las partículas extrañas, tales como los patógenos.

### Indicaciones

#### **Ganado porcino**

Aivlosin® Soluble está indicado para el tratamiento y la prevención de la Neumonía Enzoótica Porcina causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*, la Ileítis (Enteropatía Proliferativa Porcina) causada por la bacteria intracelular *Lawsonia intracellularis* y la Disentería Porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*. Aivlosin® es asimismo activo frente a *Brachyspira pilosicoli*, causante de la Colitis Porcina.

#### **Aves de corral**

Aivlosin® Soluble está indicado para la prevención y el tratamiento de la Micoplasmosis (*Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae* y otras especies de micoplasma) y enfermedades asociadas a *Clostridium perfringens* (Enteritis que causa el síndrome de cama mojada húmeda y Colangiohepatitis) en pollos, pollitas de reemplazo y pavos. Aivlosin también está indicado para la prevención y el tratamiento de la micoplasmosis (*Mycoplasma gallisepticum*) en los faisanes. Adicionalmente tiene actividad contra *Ornithobacterium rhinotracheale* (ORT) de aves de corral.

Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.

## **Posología y forma de administración**

Se recomienda calcular todas las dosis en función del peso de los animales que se vayan a tratar y de su consumo de agua. Los gránulos de Aivlosin® Soluble deben mezclarse en el agua de bebida en las siguientes cantidades\*:

### **Ganado porcino**

La dosis es 5-10 mg de actividad/kg de peso corporal durante 5 días, normalmente un sobre en 250 litros de agua de bebida.

### **Aves de corral**

Tratamiento y prevención de la enfermedad respiratoria crónica (ERC) causada por *Mycoplasma gallisepticum* (Mg), *Mycoplasma synoviae* (Ms):

- Tratamiento terapéutico de la ERC: utilizar en agua una dosis de 20-25 mg de actividad/kg de peso corporal durante 3 días, normalmente se obtiene disolviendo un sobre por cada 200 litros de agua de bebida.
- Prevención de los signos clínicos de la ERC en aves positivas a micoplasma: utilizar en agua una dosis de 20-25 mg de actividad/kg de peso corporal durante los 3 primeros días de vida. Esta pauta puede ir seguida de 10-15 mg de actividad/kg de peso corporal durante 3-4 días (normalmente un sobre por cada 400 litros) durante los periodos de estrés tales como la vacunación, cambio de pienso y/o durante 3-4 días cada mes.

Tratamiento y prevención de enfermedades asociadas a *Clostridium perfringens*:

- Prevención de los signos clínicos: utilizar 25 mg de actividad/kg de peso corporal durante 3-4 días durante los 3 primeros días de vida seguido de 10-15 mg de actividad/kg de peso corporal durante 3-4 días empezando 2 días antes de la fecha en la que se espera el brote. Para el tratamiento, utilizar 25 mg/kg de peso corporal durante 3-4 días.

Sinergia con las tetraciclinas\*:

- Se ha demostrado la sinergia entre la tilvalosina y las tetraciclinas y se ha demostrado la eficacia de la combinación de tetraciclinas y Aivlosin® en dosis menores en programas realizados en el campo.

\* únicamente en / después de consultar con su veterinario

## **Contraindicaciones, advertencias, etc.**

### ***Periodo de retiro***

En la UE, el tiempo de espera para los cerdos es de 1-2 días y para los pollos es de 2 días. No usar en gallinas que producen huevos para consumo humano.

### ***Advertencias para el usuario***

Al manipular el medicamento veterinario, se debe evitar el contacto directo con los ojos, la piel y las mucosas. Lávese bien las manos y la piel expuesta después del

---

\* Se recomienda consultar con el veterinario antes de empezar el tratamiento.

**Esta ficha técnica contiene información general. Contacte con su representante local de ECO para la información específica de su país.**

uso. En caso de contacto ocular, aclárese inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta. Las personas hipersensibles a tilvalosina tartrato deben evitar el contacto con el producto.

### ***Precauciones farmacéuticas***

No conservar el producto a temperatura superior a 25°C. Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol.

Una vez disuelto en agua, debe utilizarse la solución preparada en 3 días. Se recomienda utilizar soluciones recién hechas cada día. Si no se utiliza el contenido total del sobre, cierre bien el sobre y utilícelo en 3 días.

### ***Precauciones generales***

Únicamente para uso veterinario. Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

### ***Tamaño del envase***

Aivlosin® Soluble está envasado en sobres que vienen dentro de cajas exteriores. El contenido del sobre tiene normalmente una actividad de 25 g.

### ***Eliminación del envase***

No deje ni deseche el agua que contiene Aivlosin® en ningún lugar al que puedan acceder animales que no estén en tratamiento. Elimine los residuos derivados del medicamento y los envases vacíos de forma segura y de conformidad con las normativas locales sobre eliminación de residuos.

### **Información adicional**

Importante: Es esencial mezclar el producto en las cantidades exactas.

Si desea más información, contacte con:

ECO Animal Health  
PO Box 47542  
London N14 6WS  
Reino Unido

Tel: +44 (0)208 447 8899

Fax: +44 (0)208 447 9292

Sitio web: [www.ecoanimalhealth.com](http://www.ecoanimalhealth.com) y [www.aivlosin.com](http://www.aivlosin.com) o [www.valosin.com](http://www.valosin.com)